

Preparazione TAC con mdc

Prima di effettuare una TAC con mezzo di contrasto è necessario:

Eeguire i seguenti esami di laboratorio:

1. Azotemia
2. Creatinina
3. Q.P.E. – quadro proteico
4. Proteina di Bence-Jones

Eeguire i seguenti esami diagnostici:

1. Elettrocardiogramma refertato

Prepararsi all'Esame:

Presentarsi a digiuno da almeno 8 ore

SOLO PER I PAZIENTI AFFETTI DA QUALSIASI ALLERGIA (FARMACI O ALIMENTI)

Eeguire la seguente terapia Desensibilizzante 3 giorni prima dell'esame:

1. Zirtec 10mg – 1 capsula la sera per 3 giorni
2. Bentelan 1mg – 1 compressa al giorno per 3 giorni
3. Ranidil 300mg – 1 capsula al giorno per 3 gironi

FARMACI DA SOSPENDERE

Alcuni farmaci possono creare problemi per al paziente o all'esecuzione degli esami da farsi. In questo caso vanno sospesi qualche giorno prima. In particolare il farmaco che segue:

Metformina – da sospendere almeno 48 ore prima dell'esame, sostituendola, *previo parere del medico curante*, con altri ipoglicemizzanti orali (ad esempio SULNILUREE)

Si raccomanda, in ogni caso:

- Di assumere molta acqua sia prima che dopo l'esecuzione dell'esame
- Di portare con se tutti gli esami diagnostici eseguiti prima di questo esame al fine di una migliore e puntuale anamnesi.